

加藤小児科医院 予防接種スケジュール (1才未満) (パターン①:同時に注射を最大2種類+ロタ内服)

ワクチン名		接種済み	0才											1才
(対象年齢)		<input type="checkbox"/>	1ヵ月	2ヵ月	3ヵ月	4ヵ月	5ヵ月	6ヵ月	7ヵ月	8ヵ月	9ヵ月	10ヵ月	11ヵ月	
生ワクチン	ロタウイルス (6週～24週未満)	<input type="checkbox"/>		(1) ①		(3) ②								
不活化ワクチン	ヒブ (2ヵ月～5才未満)	<input type="checkbox"/>		①		②		(5) ③						
不活化ワクチン	小児用肺炎球菌 (2ヵ月～5才未満)	<input type="checkbox"/>		①		②		③						
不活化ワクチン	四種混合 (3ヵ月～7才6ヵ月未満)	<input type="checkbox"/>			(2) ①	(4) ②				(6) ③				
不活化ワクチン	B型肝炎 (0ヵ月～1才未満)	<input type="checkbox"/>			①	②							(7) ③	
生ワクチン	BCG (0ヵ月～1才未満)	<input type="checkbox"/>												①

1回につき13,800円

2回目接種完了期限 生後24週(168日目)

ヒブと肺炎球菌は「細菌性髄膜炎」を予防するためになるべく早めに受けましょう

3回目から7ヵ月～13ヵ月後に追加接種があります

3回目から60日以上あけて、かつ生後12ヵ月から15ヵ月の間に追加接種があります

3回目から1年後に追加接種があります

1回目から139日(20週)以上の間隔をおいて3回目

生後5ヵ月～7ヵ月が接種標準期間です

(1)～(7)は接種する順番です の中は同時接種

同じワクチンどうしの間隔	
ロタウイルス	27日以上の間隔
ヒブ	原則4週～8週間隔
肺炎球菌	27日以上の間隔
四種混合	20日～56日の間隔
B型肝炎	1回目から27日以上の間隔をおいて2回目・1回目から139日(20週)以上の間隔をおいて3回目

予防接種の時間(要予約)		
BCG	平日	9:30
その他のワクチン	平日	8:45～11:45 16:00～17:00
	土曜日	8:45～12:30
予防接種外来	平日	14:30～15:15

※上記時間帯にご希望やご質問のある方は、受付に相談してください

他の予防接種との間隔のあけ方	
生ワクチン	(生ワクチンどうしは27日以上あける)
27日以上あける	↓ ↑
6日以上あける	↓ ↑
不活化ワクチン	(不活化ワクチンどうしは6日以上あける)

《予防接種の計画を立てる時のポイント》

- ロタウイルスワクチン(内服するワクチン)は生後6週から接種可能です。初回接種は生後14週6日(104日目)までに行うことが推奨されています。
- ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチンは生後2ヵ月から接種可能です。「細菌性髄膜炎」は怖い病気ですのでなるべく早く接種しましょう。
- 四種混合ワクチンは生後3ヵ月から接種可能です。
- 四種混合・ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチンは不活化ワクチンですので、接種後6日あければ他の予防接種を受けられます。
- ロタウイルスワクチン・BCGは生ワクチンですので、接種後27日あければ他の予防接種を受けられます。

定期予防接種の対象年齢

任意予防接種の対象年齢

2019年4月1日現在