

加藤小児科医院 予防接種スケジュール (1才未満) (パターン②:同時に注射を最大4種類+口内服)

ワクチン名 (対象年齢)	接種済み □	0才											1才		
		1か月	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月			
不活化ワクチン B型肝炎 (0か月～1才未満)	□□□		(1) ①	(2) ②					(5) ③						1回目から139日(20週)以上の間隔をおいて3回目
生ワクチン ロタウイルス (6週～24週未満)	□□		1回につき13,800円 ①	②											2回目接種完了期限 生後24週(168日目)
不活化ワクチン ヒブ (2か月～5才未満)	□□□□		①	②	(3) ③										3回目から7か月～13か月後に追加接種があります
不活化ワクチン 小児用肺炎球菌 (2か月～5才未満)	□□□□		①	②	③										3回目から60日以上あけて、かつ生後12か月から15か月の間に追加接種があります
不活化ワクチン 四種混合 (3か月～7才6か月未満)	□□□□			①	②				(4) ③						3回目から1年後に追加接種があります
生ワクチン BCG (0か月～1才未満)	□								①						生後5か月～7か月が標準接種期間です

(1)～(5)は接種する順番です □の中には同時接種

同じワクチンどうしの間隔	
ロタウイルス	27日以上の間隔
ヒブ	原則4週～8週間隔
肺炎球菌	27日以上の間隔
四種混合	20日～56日の間隔
B型肝炎	1回目から27日以上の間隔をおいて2回目・1回目から139日(20週)以上の間隔をおいて3回目

予防接種の時間(要予約)		
BCG	毎日	9:30
その他のワクチン	平日	8:45～11:45 16:00～17:00
	土曜日	8:45～12:30
予防接種外来	平日	14:30～15:15

※上記時間帯にご希望やご質問のある方は、受付に相談してください

他の予防接種との間隔のあけ方	
生ワクチン (生ワクチンどうしは27日以上あける)	
27日以上あける ↓	↑ 6日以上あける
不活化ワクチン (不活化ワクチンどうしは6日以上あける)	

《予防接種の計画を立てる時のポイント》

1. ロタウイルスワクチン(内服するワクチン)は生後6週から接種可能です。
初回接種は生後14週6日(104日目)までに行うことが推奨されています。
2. ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチンは生後2か月から接種可能です。「細菌性髄膜炎」は怖い病気ですのでなるべく早く接種しましょう。
3. 四種混合ワクチンは生後3か月から接種可能です。
4. 四種混合・ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチンは不活化ワクチンですので、接種後6日あければ他の予防接種を受けられます。
5. ロタウイルスワクチン・BCGは生ワクチンですので、接種後27日あければ他の予防接種を受けられます。

2019年4月1日現在