

加藤小児科医院 予防接種スケジュール (1才未満) (パターン①:同時に注射を最大2種類+ロタ内服)

ワクチン名 (対象年齢)	接種済み	0才											1才					
		1か月	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月						
生ワクチン ロタウイルス (6週～24週未満)	□□		(1) ①		(3) ②													
不活化ワクチン ヒブ (2か月～5才未満)	□□□□		①		②			(5) ③										
不活化ワクチン 小児用肺炎球菌 (2か月～5才未満)	□□□□		①		②			③										
不活化ワクチン 四種混合 (3か月～7才6か月未満)	□□□□			(2) ①	(4) ②				(6) ③									
不活化ワクチン B型肝炎 (0か月～1才未満)	□□□			①	②						(7) ③							
生ワクチン BCG (0か月～1才未満)	□																	①

ヒブと肺炎球菌は「細菌性髄膜炎」を予防するためなるべく早めに受けましょう

2回目接種完了期限 生後24週(168日目)

3回目から7か月～13か月後に追加接種があります

3回目から60日以上あけて、かつ生後12か月から15か月の間に追加接種があります

3回目から1年後に追加接種があります

1回目から139日(20週)以上の間隔をおいて3回目

生後5か月～7か月が接種標準期間です

(1)～(7)は接種する順番です □の中は同時接種

ロタウイルス	27日以上の間隔
ヒブ	原則4週～8週間隔
肺炎球菌	27日以上の間隔
四種混合	20日～56日の間隔
B型肝炎	1回目から27日以上の間隔をおいて2回目 1回目から139日(20週)以上の間隔をおいて3回目

予防接種	平日	14:30～15:15
専用外来		

※上記以外に午前・午後・土曜日の一般診療にも予約出来ます。

定期予防接種の対象年齢

《予防接種の計画を立てる時のポイント》

1. ロタウイルスワクチンは、2020年8月1日以降に生まれた方が公費接種になります。当院ではロタリックス(2回接種)を使用しています。
2. ロタウイルスワクチン(内服するワクチン)は生後6週から接種可能です。初回接種は生後14週6日までに受けてください。
3. ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチンは生後2か月から接種可能です。「細菌性髄膜炎」は怖い病気ですのでなるべく早く接種しましょう。
4. 四種混合ワクチンは生後3か月から接種可能です。
5. 同じワクチンどうしの間隔に変更はありません。

2020年10月1日現在

