

加藤小児科医院 予防接種スケジュール (1才未満) (パターン②: 同時に注射を最大4種類+ロタ内服)

ワクチン名 (対象年齢)	接種済み	0才											1才					
		1ヵ月	2ヵ月	3ヵ月	4ヵ月	5ヵ月	6ヵ月	7ヵ月	8ヵ月	9ヵ月	10ヵ月	11ヵ月						
不活化ワクチン B型肝炎 (0ヵ月~1才未満)	□□□		(1) ①	(2) ②					(5) ③									
生ワクチン ロタウイルス (6週~24週未満)	□□		①	②														
不活化ワクチン ヒブ (2ヵ月~5才未満)	□□□□		①	②	(3) ③													
不活化ワクチン 小児用肺炎球菌 (2ヵ月~5才未満)	□□□□		①	②	③													
不活化ワクチン 四種混合 (3ヵ月~7才6ヵ月未満)	□□□□			①	②			(4) ③										
生ワクチン BCG (0ヵ月~1才未満)	□							①										

ヒブと肺炎球菌は「細菌性髄膜炎」を予防するためになるべく早めに受けましょう

2回目接種完了期限 生後24週(168日目)

3回目から7ヵ月~13ヵ月後に追加接種があります

3回目から60日以上あけて、かつ生後12ヵ月から15ヵ月の間に追加接種があります

3回目から1年後に追加接種があります

生後5ヵ月~7ヵ月が標準接種期間です

(1)~(5)は接種する順番です □の中は同時接種

同じワクチンどうしの間隔	
ロタウイルス	27日以上の間隔
ヒブ	原則4週~8週間隔
肺炎球菌	27日以上の間隔
四種混合	20日~56日の間隔
B型肝炎	1回目から27日以上の間隔を おいて2回目 1回目から139日(20週)以上 の間隔をおいて3回目

予防接種の時間(要予約)		
予防接種	平日	14:30~15:15
専用外来		

※上記以外に午前・午後・土曜日の一般診療にも予約出来ます。

定期予防接種の対象年齢

《予防接種の計画を立てる時のポイント》

1. ロタウイルスワクチンは、2020年8月1日以降に生まれた方が公費接種になります。当院ではロタリックス(2回接種)を使用しています。
2. ロタウイルスワクチン(内服するワクチン)は生後6週から接種可能です。初回接種は生後14週6日までに受けてください。
3. ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチンは生後2ヵ月から接種可能です。「細菌性髄膜炎」は怖い病気ですのなるべく早く接種しましょう。
4. 四種混合ワクチンは生後3ヵ月から接種可能です。
5. 同じワクチンどうしの間隔に変更はありません。

2020年10月1日現在

