

加藤小児科医院 予防接種スケジュール (1才未満)

ワクチン名		接種済み	0才											1才	
(対象年齢)		<input type="checkbox"/>	1ヶ月	2ヶ月	3ヶ月	4ヶ月	5ヶ月	6ヶ月	7ヶ月	8ヶ月	9ヶ月	10ヶ月	11ヶ月		
生ワクチン	ロタウイルス (6週～24週未満)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1回につき 13,800円		(1) ①	(3) ②	2回目接種完了期限 生後24週(168日目)								
不活化ワクチン	ヒブ (2ヶ月～5才未満)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ヒブと肺炎球菌は「細菌性髄膜炎」を予防するためになるべく早めに受けましょう		①	②	(5) ③	3回目から7か月～13か月後に追加接種があります							
不活化ワクチン	小児用肺炎球菌 (2ヶ月～5才未満)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			①	②	③	3回目から60日以上あけて、かつ生後12ヶ月から15ヶ月の間に追加接種があります							
不活化ワクチン	四種混合 (3ヶ月～7才6ヶ月未満)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				(2) ①	(4) ②	(6) ③	3回目から1年後に追加接種があります						
不活化ワクチン	B型肝炎 (0ヶ月～1才未満)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				①	②	1回目から27日以上の間隔をおいて2回目		(8) ③	1回目から139日以上の間隔をおいて3回目				
生ワクチン	BCG (0ヶ月～1才未満)	<input type="checkbox"/>	平成25年4月1日から、生後1才未満に変わりました 生後5か月～7か月が標準接種期間です							(7) ①					

□の中は同時接種(当院のおすすめスケジュール)

同じワクチンどうしの間隔	
ロタウイルス	27日以上の間隔
ヒブ	原則4週～8週間隔
肺炎球菌	27日以上の間隔
四種混合	20日～56日の間隔
B型肝炎	1回目から27日以上の間隔をおいて2回目・1回目から139日以上の間隔をおいて3回目

当院の予防接種外来(要予約)	
BCG	毎週金曜日 8:30～9:00
その他のワクチン	毎週火・金曜日 14:30～15:30など

他の予防接種との間隔のあけ方		
生ワクチン		
(生ワクチンどうしは27日以上あける)		
27日以上 あける	↓ ↑	6日以上 あける
不活化ワクチン		
(不活化ワクチンどうしは6日以上あける)		

定期予防接種の対象年齢
任意予防接種の対象年齢

《予防接種の計画を立てる時のポイント》

1. 当院では2種類(ロタを含む場合は3種類)のワクチンの同時接種を行っています。
2. ロタウイルスワクチンは生後6週から接種可能です。初回接種は生後14週6日(104日目)までに行うことが推奨されています。
3. ヒブと肺炎球菌ワクチンは生後2ヶ月から接種可能です。「細菌性髄膜炎」は怖い病気ですのでなるべく早く接種しましょう。
4. 四種混合ワクチンは生後3ヶ月から接種可能です。
5. 四種混合・ヒブ・肺炎球菌は不活化ワクチンですので、接種後6日あければ他の予防接種を受けられます。
6. ロタウイルスワクチン・BCGは生ワクチンですので、接種後27日あければ他の予防接種を受けられます。
7. 平成28年10月1日から、B型肝炎ワクチンが定期接種(公費負担※)となりました。

※公費負担の対象年齢: 1才未満(平成28年4月1日以降生まれの方)

平成28年10月1日現在